

Maîtriser la santé de vos arbres fruitiers tout au long de l'année

Hiver : Le temps de la prévention

- Appliquer un traitement d'hiver à l'huile blanche ou à la bouillie bordelaise sur le tronc et les branches.
- Effectuer ces traitements uniquement par temps sec et hors gel, après la taille, pour éliminer les œufs et spores hivernants.

Printemps : Démarrage et protection des floraisons

- Renforcer les défenses immunitaires de l'arbre avec du purin d'ortie (dilution à 10%) en début de saison.
- Au stade 'bouton rose' du pommier, traiter contre la tavelure et le puceron cendré avec du soufre ou du savon noir.
- Installer les diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle contre le carpocapse dès la floraison, avant le premier vol.
- Respecter une zone d'exclusion totale pour tout traitement phytosanitaire pendant la floraison afin de protéger les abeilles et pollinisateurs.

Été : Surveillance et lutte ciblée

- Programmer les traitements au bacille de Turinge (Bt) contre le carpocapse entre mai et août, en suivant les courbes de vol régionales.
- Maintenir les nichoirs à mésanges pour favoriser la régulation naturelle des vers des fruits (carpocapses) tout au long de la saison.

Automne : Préparation et récolte

- Poser des bandes de glu sur les troncs dès septembre-octobre pour piéger les femelles de la cheimatobie.
- Récolter les fruits avec le plus grand soin pour éviter les blessures, qui sont les portes d'entrée principales de la moniliose lors du stockage.
- Retirer et détruire systématiquement tous les fruits 'momifiés' restant sur l'arbre après la récolte pour limiter la propagation de la moniliose.